

Uj árszabványunk és a százalék-engedmények. Gy. É. 15. sz. — A „Pester Loyd“ és a szabad-ipar. Gy. É. 16. sz.

*Megjegyzés:* Könyvek és különálló füzetek az egyes csoportok elején a szerző nevének dílt betűkkel való nyomtatásával vannak jelölve. Rövidítések: B. K. = Bába Kalauz. Egész. = Egészség. Gy. = Gyógyászat. Gy. Á. = Gyermekeápolás. Gy. H. = Gyógyszerészi Hetilap. Gy. K. = Gyógyszerészi Közlöny. Gy. É. = Gyógyszerészi Értesítő. H. = Honvédorvos. K. F. = Klinikai Füzetek. K. és T. O. = Közegészségtan és Törvényszéki Orvostan. M. O. A. = Magyar Orvosi Archivum. M. = Medikus. M. Ch. F. = Magyar Chemiai Folyóirat. O. H. = Orvosi Hetilap. É. = Orvostudományi Értesítő. Sz. = Szemészet. Sz. L. = Szülésznők Lapja. U. Gy. és Gy. = Ujabb Gyógyszerek és Gyógymódok. B. Köz. = Belügyi Közlöny. E. É. = Egészségügyi Értesítő.

## Jegyzőkönyvek

az Erdélyi Múzeum-Egylet orvostermészettudományi szakosztályának orvosi szaküléseiről.

V. Szakülés 1897. május 7-én.

Elnök: Purjesz Zsigmond tnr. Jegyző: Genersich Gusztáv m. tnr.

I. Genersich Gusztáv m. tanár bemutat egy 3 hónapos csecsemőt, ki egészséges és elég fiatal szülőknek II. gyermeke, korához képest gyengében táplált és fejlett, de arányosan nőtt. Mig rendes körülmények közt a foetus rostos koponya boltozata születéskor már annyira elcsontosodott, hogy csak a nagy fontanella marad lágy és a varratok, bár még nincsenek összenöve, még is már egymást érintik, jelen esetben, úgyszólván az egész koponya boltozat meglehetősen lágy, az összes varratok még  $1\frac{1}{2}$  harántujjnyira nyitvák, sőt a csontszélek is  $1-1\frac{1}{2}$  cmnyire benyomhatók, az összes fontanellák nyitvák, úgy hogy az egész koponyán csupán a faldudorok helyén egy-egy koronanagyságú, az occiputon egy féltallérnyi kemény hely van. A homlok csont középvonali varrata az orrgyökig anyitva van, de a homlok csont a hajas részig eléggé kemény.

II. Apáthy István: A pióczáknak véralvadást gátló váladékáról (mikroszkop. készítmények bemutatásával). L. Értesítő 206—220. lapjain.

III. Benel János: A Credé-féle ezüst sebkezelésről. L. Értesítő 167—186. lapjain.

IV. Bogár Kálmán: Az itrol és az ezüstös kötőszerek antisepticus hatásáról. L. Értesítő 187—205. lapjain.

VI. Szakülés 1897. június 11-én.

I. Veszprémi Dezső dr. a belgyógyászati kórodán fekvő beteget mutat be, kinél mindkét oldali peroneus hűdés van jelen; a nagymérvű atrophian kívül a többi jelenségek is a mellett szólnak, hogy a bántalom peripheriás természetű. Érdekes az, hogy a beteg ezelőtt 5 hónappal typhus abdominalisban szenvedett, mi mellett szól az is, hogy vérével a Widal-reactió most is jól sikerül. Mintán typhusa előtt teljesen jól tudott járni, igen valószínű,

hogy e peroneus-hűdés azok közé tartozik, melyek typhus után szoktak fellépni és talán épúgy tekinthetők toxicus eredetűeknek, mint a diphtheria után fellépő hűdések.

II. Rudas Gerő m. tnr.: Adalékok a fogbél szövettanához. L. Értesítő 221—230. lapjain.

III. Jancsó M. és Rosenberger M. dok: A typhus serodiagnosisáról. L. Értesítő 231—277. lapjain.

Hozzászól ez utóbbi előadáshoz:

Buday tnr: reflectálva egy az előadók által pyaemiának tartott esetre: A sectionál ő is pyaemiának nézte, később azonban az apró vesetályogokban nem coccusokat, hanem bacillusokat talált, melyek minden tulajdonságukban megfeleltek a Klebs-Eberth féle typhus-bacillusoknak. Ezért azt hiszi, hogy a pyaemiának nézett eset egy oly typhus abdominalis volt, melynél a typhus bacillusok localisatiója a vesében — mint egymagában véve a ritkább jelenség — pyaemiához hasonló tüneteket hozott létre.

Tekintettel az idő előhaladottságára Engel Gábor és Genersich Gusztáv bejelentett előadásai a következő szakülésre maradnak.



F 1922/23 - 25.

