

de újabb vizsgálatai alapján *Achnanthes exigua* GRUN.-nak határozhatta meg.

5. THAISZ LAJOS bemutatja és ismerteti a budapesti m. kir. állami Vetőmagvizsgáló Állomás kiadásában megjelenő »Magyar füvek« gyűjteményének IV., V. és VI. kötetét.

6. BERNÁTSKY JENŐ »Az *Asparagus* másodlagos ivari különbsége« czímen tart előadást. Hogy a hazai *Asparagus*-fajok két- sőt háromlakúak, azaz hogy a termős és porzós virágok többnyire különböző egyedeken oszlanak el, az régebb idő óta ismeretes. BERNÁTSKY azt találta, hogy a termős és porzós virágú egyedek tenyészteti szerveikben is különbözőek, és ezt a jelenséget az állattanban használt kifejezéssel élve, *másodlagos* ivari különbségnek nevezhetjük. A másodlagos ivari különbségek félrevezették a szisztematikusokat, akik a tenyészteti szervek eltéréseit látták ugyan, de okát

nem tudván, új rendszertani alakokat (forma) különböztettek meg.

A tárgyhoz SZABÓ ZOLTÁN szólván, megjegyzi, hogy ő is hasonló ivari különbségeket fedezett föl a *Knautia*-k tanulmányozásakor, ahol ugyanis a nővirágzatok gyakran pl. kisebb fejcskék, eltérő cséscselevelek által különböznek a hímnős virágzatúaktól.

A tárgyhoz még MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR, TUZSON JÁNOS, SCHILBERSZKY KÁROLY és KLEIN GYULA szólanak. Felszólásaikkal annak a véleménynek adnak kifejezést, hogy a BERNÁTSKY ismertette ivari jelenségek a szóban forgó virágok felemás alakú szerkezetére vallanak.

MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR a másodlagos ivari »különbség« kifejezést rosszalja, helyesebb a másodlagos ivari »jellegek«, használatát ajánlja, mert a növényeknél a jellegek adják meg a különbséget.

---

## SZEMÉLYI HIREK.

Dr. ISTVÁNFFI GYULÁ-T, a m. kir. Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelologiai Intézet igazgatóját a párisi tudományos akadémia a »Thore«-díjjal tüntette ki.