

szakításokkal bár, Göncön a Nagy-hó s az attól D-re fekvő Hevita nevű dűlő lejtőin is megtaláljuk

A *pleisztocén* lerakódásaira vonatkozólag még annyit emelhetünk ki, hogy azok túlnyomóan *löss*-ből állanak. A hegységhez közelfekvő dombok egy részét *nyirok* takarja, azonban utóbbinak lösszel szemben való határát még közelítőleg se lehet megállapítani.

Végül még megjegyezhetem, hogy Göncön a téglavetővel szemben levő lejtőn lösztől eltakarva, erősen *vasokkeres* agyag települ. Hasonló ez a Fony határában ezidőszerint fejtett ama előforduláshoz, amelynek anyagát vasnyerés céljából állítólag Diósgyőrre szállítják.

ДОКЛАД О РЕАМБУЛАЦИОННЫХ СЪЕМКАХ ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 1947 ГОДУ В РАЙОНЕ ГЕНЦ

А. Л и ф ф а

Автор производил съемку, петрографическое исследование и составление вулканических пород как то: риолитов (перлит, пемза, обсидиан) и андезитов, а также андезитовых туфов, составляющих исследуемую территорию, обращая особое внимание на их залегание.

COMPTE RENDU DES ÉTUDES GÉOLOGIQUES RÉAMBULATIVES DANS LES ENVIRONS DE GÖNC EN 1947

Par A. Liffa

Résumé

Les travaux réambulatifs exécutés pendant la durée d'un mois s'étendaient surtout à l'examen précis des différentes variétés des rhyolithes ainsi qu'à l'investigation de leur rapports avec les andésites et à l'indication de certaines effusions rhyolithiques de la montagne, les indications s'étant prouvées incomplètes par endroits.

Parmi les formations sédimentaires surtout les tufs rhyolithiques, les couches caillouteuses et argileuses exigeaient une réambulation plus minutieuse, principalement pour établir leurs rapports réciproques.

A. Formations éruptives

a) Les andésites attiraient une attention particulière car en quelques endroits leurs rapports réciproques n'étaient pas suffisamment établis,