



A füvesítés buktatói

A FÜVESÍTÉS EGYSZERŰNEK TŰNIK, DE MEGFELELŐ ESZKÖZÖK NÉLKÜL, MINŐSÉGI ANYAGOK (VETŐMAG, TÁPANYAGBAN GAZDAG TALAJ) ÉS NEM UTOLSÓSORBAN RENGETEG LOCSOLÓVÍZ, VALAMINT A FENNTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TEMÉRDEK IDŐ NÉLKÜL NEM AZ. EZ MIND FELTÉTELE ÉS TITKA A SZÉP ZÖLD GYEPNEK.

NAGYKUTASI VIKTOR

Ha a termőrétegünk nem megfelelő, azaz legalább 15-20 cm-nél nem vastagabb, akkor a talaj hamar kiszárad, így több vízre és tápanyagra lesz szükség a fenntartás során, és ez folyamatosan fennálló probléma lesz. A két talajréteg között pedig vízzáró réteg alakul ki, így a gyökérzet nem tud mélyre hatolni, és nagyobb eső után pangó víz keletkezik. Ha nem jól végezzük a talajmunkát, a tereprendezést, akkor egyenetlen lesz a talajfelszín, ami foltos kelést és később a fűnyíróval tarvágást

eredményezhet. Ezt legegyszerűbben egy széles gereblyével vagy lehúzófával történő egyengetéssel tudjuk megelőzni.

Ha vetés előtt elmaradt vagy nem megfelelő a gyomirtás, akkor sajnos első évben gyomos pázsitunk lesz. Ugyanis vetést megelőzően érdemes egy, vagy erősen gyomos területeken két (tarackoló növények ellen) gyomirtást végezni (fozát hatóanyagú szerrel): ezek a zöld növényi részen keresztül felszívódnak a növénybe és a gyökerébe is, és ott 12-14

nap alatt fejtik ki hatásukat. Permetezést, gyomirtást követően 2-3 órán át nem eshet csapadék! Szánjunk időt a vetés előtt a gyomok eltávolítására. Ezt követően végezhető el az első talajmunka. Ez a feltöltött, vagy nagyon rég művelt kerteknél fordul elő.

Fontos a pontosan, egyenletesen kiszórt, jó minőségű fűmag. Egy négyzetméterre 4-5 dkg a szükséges mennyiség, persze nagyon egyenle-



Lehetőleg gyűjtőtartályos fűnyírót használjunk az első nyírások alkalmával

tesen kiszórva. De figyeljünk, a túlzott magszórás sem jó, ugyanis a gombás fertőzések melegágya lehet. A fűmag a talajfelszínen csírázik, ezért ne dolgozzuk be túl mélyre. Ennek feltétele a finom morzsalékos talaj, amit vetés előtt és után is szép egyenletesre tudunk hengerezni, ügyelve arra, hogy a fűmagok egy cm-nél ne kerüljenek mélyebbre. Ezt követi a rendszeres és alapos, napjában többszöri beöntözés egészen az első fűnyírásig, ami 14-21 nap múlva várható. Ezt követően a locsolásból vegyünk vissza. Ha nem kap elég tápanyagot a kikelő fű, nem fog egyenletesen bokrosodni, fejlődni. Ezért tartós felszívódású műtrágyát vagy talajjavító szerves trágyát dolgozzunk be vetés előtt a talajba.

Ha keveset öntözünk, rosszul vagy egyáltalán nem csírázik ki a fűmag. Fontos, hogy vetést követően a felső 4-5 cm-es talajréteget folyamatosan nedvesen tartsuk. Jó megoldás az első 8-10 napban a talajfelszínt árnyékoló szövetrel, azaz a Raschel-lapkelmével takarni.

Túlöntözés

Sajnos véletlenül is előfordulhat, hogy a frissen vetett fűvet egy nagyobb eső vagy egy el nem zárt szórófej túlöntözi. Olyankor összerosódik a fűmag, vagy lejtős területen lemossa a talajfelszínnel együtt. De ennél is rosszabb, ha talajhiba (nagyon tömörödött a talaj) miatt pangó víz alakul ki, ami akár a gyökérzet fulladásához, azaz a növényünk pusztulásához vezet.

Ezért fontos a jó minőségű és szerkezetű talaj előkészítése. Ha már kicsírázott a fűmag, a napi 2-3 öntözést visszavehetjük egyre. Ha a fűszálak már akkorára megnöttek, hogy a végük vissza-



Lombfűvóval távolítsuk el a friss fűvetésről a lehullott leveleket

hajlik, akkor jöhet az első fűnyírás, lehetőleg fűgyűjtős géppel, 5-7 cm magasan. Előtte élesítsük meg a fűnyíró kését. Ha végeztünk a nyírással, nem túl nehéz hengerrel gyorsan járjuk át a felületet, hogy az esetleg kiemelt fűszálak gyökérzetét visszatömörítsük a talajba. Ha nagyon vizes vagy páras a gyepp, várjunk a fűnyírással. Ez lesz az a munkafázis, amit ettől kezdve 5-7 naponta el kell végeznünk.

Ha robotfűnyírónk van, akkor is az első 2-3 nyírást még mindenképpen hagyományos fűnyíróval végezzük el. Ezután jöhet a robotizált kertápolás.

Inkább ősszel

Szeretnék még pár tanácsot adni, amivel könnyebb és eredményesebb lesz a gyepterápia, és így még zöldebb lesz a kertünk. Hiszen a zöld gyepterápia, a kedvező klimatikus hatása a család apraja nagyja számára csodálatos környezetet nyújt. Arra készüdjünk fel, hogy egy szép zöld, ápolt gyepterápia rengeteg munkát, törődést, anyagi ráfordítást és nagyon sok öntözővizet igényel. A tervezésnél figyeljünk oda, hogy ne csak fű legyen a kertben, hanem lomblevelű örökzöldek, virágzó cserjék, és ha lehet, virágzó évelők is, így természetes és nem művi környezetben lesz a házunk vagy a nyaralónk.



A túllocsolás miatt kialakulhatnak gombás foltok a gyepten

A legnagyobb kérdés, hogy mikor vessük a fűmagot? Az utóbbi évek időjárása az őszi vetést hozza ki nyertesként, a szeptembertől novemberig tartó időszakban. Az is az őszi vetés mellett szól, hogy az egyári gyomok már nem csíráznak, így kevésbé gyomosodik a vetés. Tavaszra, mire újból gyomosodna, már féléves a gyepterápia, így nyugodtan használhatunk szelektív kétszikű gyepterápia-ellenes szerkeztet. Az őszi párás reggelek még nagyban hozzásegítenek a gyors és biztos csírázáshoz, keléshez.

Az egyetlen gond talán a fákról lehulló lomb lehet, ami alatt kipállik a gyenge fű. De lombfűvó

segítségével naponta vagy kétnaponta lefújhatjuk a leveleket a területről. Így nem taposunk agyon a talajt és a gyepterápia nyomai sem látszódnak meg a friss fűszálak között.

Az öntözés is nagy felelősség, még egy kiépített automata locsolórendszer is okozhat galibát, ha rosszul állítjuk be.



Őszi vetés után a következő évben már használhatunk speciális gyepterápia-ellenes szerkeztet

Mire is figyeljünk vetés után? Az első 2-3 hét a kritikus, ilyenkor lényeges, hogy folyamatosan nedvesen tartsuk a talajt. Az első nyírást követően viszont már heti 1-2 napot hagyjuk a gyepterápia száradni, ne öntözzük.

A legjobb minden másnap vagy harmadnap a kora reggeli locsolás. A harmattal együtt felvett víz hasznosul a legjobban. Inkább nagyobb adag vízzel locsoljunk, így a gyökérzet mélyebbre kúszik és több vizet és tápanyagot tud felvenni.

A túllöntözött gyepterápia fogékonyabb a gombás fertőzésekre, és a sok vízzel a tápanyagot is kimossa a talajból. Most ősszel a káliumtúlsúlyos műtrágyával készítsük fel a gyepterápia-t a télre.

A már beállt gyepterápia szerves trágyát is használhatunk, így a talaj szerkezetét is javíthatjuk.

Utoljára pedig a nyírásra figyeljünk: alkalmazzuk az egyharmad szabályt, ami azt jelenti, hogy a fűszál hosszának csak a felső egyharmadát vágjuk le egy-egy nyírás alkalmával. A túl mélyen lenyírt gyepterápia nagyon rosszul tűri a stresszt, mert a gyökérzete sem tud mélyre hatolni. Így mind a kiszáradásra, mind a tápanyaghiányra nagyon gyorsan reagál.

Érdekességek a kertészet világából




Talajtakaró fólia helyett lebomló papír

Bizonyos kertészeti kultúrákban úgyszólván nélkülözhetetlenek a különféle talajtakaró fóliák: segítenek visszaszorítani a gyomokat, hamarabb melegszik fel alattuk a talaj, és a párolgási veszteség is kevesebb a takart felületeken. Nem lebomló voltak miatt azonban rengeteg fejtörést is okoznak a műanyag fóliák. Németországban igéretes kísérletek zajlanak a papír alapú helyettesítő termékekkel.



Drágám, lekapcsolnád kérlek a világító leandert?

2017 decemberében a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói bejelentették, hogy megtalálták a módját, hogyan hozhatnak létre fényt kibocsátó növényeket. Ezt úgy érték el, hogy speciális nanorészecskéket ágyaztak a vizitorma leveleibe, amelyek lehetővé tették, hogy közel négy órán keresztül halvány fényt bocsássanak ki.



Még októberben is terem a magaságyásunk

A kiadónk udvarán tavasszal létesített magaságyás még így októberben is bőségesen terem. Mostanra felkerült rá egy tábla is: "Gyurka bácsi emlékére" felirattal, a tavaly júniusban elhunyt Bálint György emlékére.

**A kertészettel kapcsolatos bővebb tartalomért
keresse fel naponta frissülő hírportálunkat,
a magyarmezogazdasag.hu-t!**